



مؤسسه آموزشی فرهنگی

دانش طلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۰

سال تحصیلی ۹۹-۰۰

# آزمون آزمایشی شماره ۸

## آزمون اختصاصی

### گروه آزمایشی علوم تجربی

وقت پیشنهادی	تا شماره	از شماره	تعداد پرسش	مواد امتحانی
۱۵ دقیقه	۱۲۰	۱۰۱	۲۰	زمین‌شناسی
۴۰ دقیقه	۱۴۵	۱۲۱	۲۵	ریاضی
۲۸ دقیقه	۱۸۵	۱۴۶	۴۰	زیست‌شناسی
۳۲ دقیقه	۲۱۰	۱۸۶	۲۵	فیزیک
۳۰ دقیقه	۲۴۰	۲۱۱	۳۰	شیمی
مدت پاسخ‌گویی: ۱۴۵ دقیقه		تعداد کل پرسش‌ها: ۱۴۰		

همچنین، شما می‌توانید با  
اسکن تصویر روبه‌رو  
به‌وسیله گوشی هوشمند و یا  
تبلت خود، پاسخ تشریحی  
درس‌های عمومی و اختصاصی  
در مشاهده نمایید.



داوطلب گرامی، جهت استفاده از خدمات طلایی خود مانند  
کارنامه‌های هوشمند بعد از آزمون ارزشیابی، پیش‌آزمون‌های آنلاین،  
بانک سوال گرینه‌دو، رفع اشکال هوشمند، جزووهای کمک‌آموزشی،  
آرشیو آزمون‌های گرینه‌دو و...، با استفاده از شماره داوطلبی  
(به عنوان نام کاربری) و کدملی خود (به عنوان رمز عبور)  
وارد وب‌سایت گرینه‌دو به آدرس [gozine2.ir](#) شوید.  
در صورتی که اینترنتی ثبت‌نام کرده‌اید، رمز عبور شما همان  
رمزی است که خودتان انتخاب فرموده‌اید.



۱۰۱- کدام مورد، از اهمیت‌های مطالعه شکستگی‌های پوسته زمین نیست؟

- (۱) احداث توفل      (۲) ذخیره آب زیرزمینی      (۳) تجمع ذخایر زغالسنگ      (۴) تجمع ذخایر نفت و گاز

۱۰۲- کدام گزینه با ویژگی و نوع تنش در تصویر رو به رو، مطابقت دارد؟

(۱) فرادیواره نسبت به فروذیواره، به بالا حرکت کرده و تنش فشاری است.

(۲) فرادیواره نسبت به فروذیواره، به پایین حرکت کرده و تنش کششی است.

(۳) لغزش سنگ‌ها محسوس بوده و در امتداد سطح گسل است.

(۴) حرکت قطعات شکسته شده، در امتداد افق می‌باشد.

۱۰۳- در منطقه‌ای، درزهای از نوع قائم نسبت به مایل فراوان‌تر است. قطعاً در سنگ‌های این محل، .....

(۱) لغزش سنگ‌ها در امتداد قائم بیش از سطوح زاویه‌دار بوده است.

(۲) نیروهای حرکتی قائم بیشتر از نیروهای افقی بوده‌اند.

(۳) هیچ نوع جابه‌جایی قائم و یا زاویه‌داری در سنگ‌ها، ایجاد نشده است.

(۴) طبقات روی سطح درزه، حرکت بیشتری در محور عمودی داشته‌اند.

۱۰۴- کدام عبارت زیر در مورد زمین‌لرزه، درست است؟

(۱) پخش و توزیع پراکندگی زمین‌لرزه‌ها در زمین، یکسان است.

(۲) تمام زمین‌لرزه‌ها در کمریند لرزه خیز آپ-هیمالیا اتفاق می‌افتد.

(۳) محل اصلی وقوع زمین‌لرزه‌ها درون ورقه‌های سنگ کره قاره‌ای قرار دارد.

(۴) وقتی انرژی زمین‌لرزه آزاد می‌شود که تنش از مقاومت سنگ بیشتر باشد.

۱۰۵- تفاوت کانون زمین‌لرزه با مرکز سطحی زمین‌لرزه، کدام مورد است؟

(۱) قدرت لرزه      (۲) زمان وقوع      (۳) محل قرارگیری      (۴) میزان لرزش



۱۰۶- موج لرزه‌ای ثبت شده در شکل رو به رو، دارای کدام ویژگی است؟

(۱) در اثر برخورد امواج درونی با سطح لایه‌بندی ایجاد شده است.

(۲) دارای بیشترین سرعت و حرکت آن شبیه امواج دریاست.

(۳) این موج فقط از محیط‌های جامد می‌تواند عبور کند.

(۴) تأثیر آن از سطح به عمق کاهش می‌یابد.

۱۰۷- دامنه امواج زمین‌لرزه‌ای با بزرگی  $2/9$  ریشتر، چند برابر زمین‌لرزه‌ای با بزرگی  $4/9$  ریشتر است؟

(۱)  $0/02$       (۲)  $10^2$       (۳)  $2^2$       (۴)  $0/01$

۱۰۸- هرچه انرژی آزاد شده از یک زمین‌لرزه ..... باشد، ارتعاشات ناشی از امواج آن ..... خواهد بود.

(۱) شدیدتر - پایین‌تر      (۲) بیشتر - بی‌نظم      (۳) کمتر - بدون تغییر      (۴) کمتر - کمتر

۱۰۹- چه تعداد از عبارت‌های زیر، در رابطه با اینمی در برابر زمین‌لرزه درست است؟

■ بسته وسایل کمک‌های اولیه را قبل از وقوع زمین‌لرزه آماده کنید.

■ بیشتر آسیب دیدگی‌ها هنگام وقوع زمین‌لرزه به علت توقف اتومبیل است.

■ مراقب پیش‌لرزه‌ها در زمان لرزه باشید.

■ بعد از زمین‌لرزه در منزل بمانید و به رادیو گوش کنید.


(۱)  $4/4$

(۲)  $3/3$

(۳)  $2/2$

(۴)  $1/1$

۱۱۰- شکل رو به رو کدام پدیده زمین‌شناسی را نشان می‌دهد؟



(۱) گسل افقی

(۲) ناودیس

(۳) تاقدیس

(۴) چین تک‌شیب

# زمین‌شناسی

# داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰

۲

دفترچه شماره ۳ - آزمون شماره ۸ اختصاصی (گروه آزمایشی علوم تربیتی)

- ۱۱۱- ذرات آتشفسانی حدود ۶ میلی‌متر را ..... می‌نامند و این ذرات به صورت ..... از دهانه آتشفسان خارج می‌شوند.
- (۱) لایپلی - لاوا      (۲) خاکستر - تفرا      (۳) لایپلی - تفرا      (۴) بمب - گدازه
- ۱۱۲- با افزایش سیلیس ( $\text{SiO}_2$ ) در گدازه‌های آتشفسانی، ..... بیشتر خواهد شد.
- (۱) خروج گازهای آتشفسانی      (۲) ارتفاع مخروط آتشفسان
- (۳) اندازهٔ ذرات پرتابی      (۴) سخت‌شدگی مواد آذرآواری
- ۱۱۳- آتشفسان‌ها گاهی باعث حاصلخیزی خاک‌ها می‌شوند. علت این امر کدام است؟
- (۱) گرمای زیاد گدازه‌ها باعث ایجاد واکنش‌های مفید در گوشهٔ زمین می‌شود.
- (۲) هوازدگی خاکسترهای گدازه‌ها باعث تشکیل خاک و افزایش عناصر مفید می‌شود.
- (۳) آب‌های گرم با خروج از زمین سرد شده و آب‌های جاری را افزایش می‌دهند.
- (۴) با خروج گدازه‌ها، انرژی درونی زمین سبب ثابت شدن حرکت خاک‌ها می‌گردد.
- ۱۱۴- کدام مورد زیر از نظر سن زمین‌شناسی نسبت به بقیه، جوان‌تر است؟
- (۱) گندوانا      (۲) استرالیا      (۳) سیبری      (۴) البرز
- ۱۱۵- در جدول رو به رو، کدام منطقه با جاذبهٔ زئوتوریستی آن انتظام ندارد؟

جاذبهٔ زئوتوریستی	منطقه
درهٔ ستارگان	قشم
بازالت منشوری	چابهار
گنبند نمکی	جاشک
چشمۀ باداب سورت	ساری
غار علیصدر	همدان

- (۱) چابهار  
(۲) جاشک  
(۳) ساری  
(۴) همدان

- ۱۱۶- ذخایر فراوان منیزیت را در کدام پهنهٔ زمین‌ساختی ایران می‌توان یافت؟
- (۱) ایران مرکزی      (۲) شرق و جنوب‌شرق      (۳) سهند و بزمان      (۴) کوه‌داغ
- ۱۱۷- کدام مورد نمی‌تواند دلیل منطقی برای فراوانی نفت و گاز در زاگرس باشد؟
- (۱) فراوانی سنگ‌های رسویی      (۲) توالی سنگ‌های متعدد      (۳) چین‌خوردگی زیاد      (۴) تاقدیس و ناویدیس متوالی
- ۱۱۸- کدام مورد در نقشه‌های زمین‌شناسی دیده نمی‌شود؟
- (۱) جنس سنگ‌ها      (۲) پراکندگی سطحی سنگ‌ها      (۳) وضعیت گسل‌ها      (۴) موقعیت آب‌وهوازی
- ۱۱۹- کدام گسل با گسل درونه، هم‌راستا است؟
- (۱) ترود      (۲) البرز      (۳) مشا      (۴) کازرون
- ۱۲۰- هدف از ایجاد زئپارک‌ها، کدام است؟
- (۱) معرفی جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی      (۲) ایجاد زئپارک‌ها      (۳) توسعهٔ فرهنگ و اقتصاد در نقاط مختلف کشور

۱۴۰

# ریاضی

زمان پیشنهادی

ریاضی ۳: فصل ۴ درس ۲ از ابتدای «قاعدهٔ زنجیری» (صفحه ۸۷) و درس ۳ و فصل ۵ ■ ریاضی ۲: فصل ۱ درس ۱ و فصل ۲

۱۲۱- طول پاره خطی که از نقطه  $A(-3, -1)$  بر خط  $5x + 12y = 7$  عمود رسم می‌شود، کدام است؟


$$\frac{4}{13} \quad (4)$$

$$\frac{10}{13} \quad (3)$$

$$\frac{10\sqrt{13}}{13} \quad (2)$$

$$\frac{4\sqrt{13}}{13} \quad (1)$$

۱۲۲- شکل رو به رو مثال نقضی برای عکس کدامیک از قضایای زیر است؟



(۱) اگر در یک چهارضلعی قطرها بر هم عمود باشند، مساحت آن برابر نصف حاصل ضرب دو قطر است.

(۲) اگر یک چهارضلعی مستطیل باشد، اقطار آن با هم مساوی هستند.


(۳) اگر یک چهارضلعی لوزی باشد، اقطار آن بر هم عمود هستند.

(۴) اگر یک متوازی‌الاضلاع، لوزی باشد، اقطار آن متوازی‌الاضلاع بر هم عمود هستند.

# ریاضی

## داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰

۱۲۳- در شکل رو به رو، مقدار  $x$  کدام است؟




- (۱) ۷/۵  
(۲) ۸  
(۳) ۱۰  
(۴) ۸/۵

۱۲۴- درباره چهار عدد حقیقی  $a, b, c$  و  $d$  می‌دانیم  $\frac{a-b+1}{c-d+1} = \frac{b-1}{d}$  از نتیجه‌گیری‌های زیر حتماً درست است؟

$$\frac{a-1}{b} = \frac{c}{d+1} \quad (۴) \quad \frac{a+1}{b} = \frac{c}{d-1} \quad (۳) \quad \frac{a}{b+1} = \frac{c-1}{d} \quad (۲) \quad \frac{a}{b-1} = \frac{c+1}{d} \quad (۱)$$

۱۲۵- در مثلث قائم‌الزاویه  $ABC$  ضلع  $AC$  برابر ۳ و ارتفاع  $AH$  برابر ۱ است. طول پاره خط  $BH$  کدام است؟



- (۱)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$   
(۲)  $\frac{\sqrt{8}}{3}$   
(۳)  $\frac{\sqrt{2}}{4}$   
(۴)  $\frac{\sqrt{8}}{6}$

۱۲۶- در مثلث متساوی‌الساقین  $ABC$ ، می‌دانیم  $AB = AC = 5$ . اگر مساحت مثلث  $C$  برابر ۱۵ باشد، فاصله نقطه  $M$  واقع در وسط قاعده  $BC$  از ساق  $AB$  کدام است؟

- (۱) ۱/۵  
(۲) ۲  
(۳) ۳  
(۴) ۶

۱۲۷- در شکل رو به رو، مساحت ذوزنقه  $ABCD$  برابر ۱۵ است. مساحت مثلث  $ABO$  که از امتداد دادن ساق‌های ذوزنقه به وجود می‌آید، کدام است؟



- (۱) ۱۰  
(۲) ۱۲  
(۳) ۱۵  
(۴) ۱۸

۱۲۸- نقاط  $A(3, -7)$  و  $B(-3, -1)$  روی دایره‌ای قرار دارند که یکی از قطرهای آن روی خط  $y = 2x - 5$  است. اندازه شعاع این دایره کدام است؟

- (۱)  $\sqrt{17}$   
(۲)  $2\sqrt{2}$   
(۳) ۵  
(۴)  $2\sqrt{5}$

۱۲۹- در شکل رو به رو، نقاط  $A(1, -5)$ ،  $B(-1, -2)$  و  $D$  روی یک خط قرار دارند. اگر طول  $AD$  چهار برابر طول  $AB$  باشد، مجموع طول و عرض نقطه  $D$  کدام است؟




- (۱) ۱۱  
(۲) ۲۲  
(۳) -1  
(۴) صفر

۱۳۰- کدام نقطه روی نیمساز ربع سوم با دو نقطه  $A(-1, -3)$  و  $B(3, 5)$  متشابه با مساحت ۸ تشکیل می‌دهد؟

- (۱)  $(-4, -4)$   
(۲)  $(-3, -3)$   
(۳)  $(-2, -2)$   
(۴)  $(5, 5)$

۱۳۱- در مثلث  $ABC$  با طول اضلاع  $AC = 9$  و  $AB = 6$ ، میانه  $CM$  و پاره خط  $BP$  رسم شده است.

اگر  $\hat{M} = \hat{P} = 60^\circ$ ، طول پاره خط  $PC$  کدام است؟



- (۱) ۴  
(۲) ۵  
(۳) ۶  
(۴) ۷



# داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰

## ریاضی

۱۴

دفترچه شماره ۲ - آزمون شماره ۸ اختصاصی (گروه آزمایشی علوم تبریز)

۱۳۲ - کدام تابع زیر روی بازه  $(-\infty, +\infty)$  مشتق پذیر است؟ [ ] نماد جزء صحیح است.

$$y = \sqrt[3]{x}$$

۴

$$y = \frac{1}{x}$$

۳

$$y = |x|$$

۲

$$y = [x]$$

۱

۱۳۳ - ماکریم مطلق تابع  $y = x^3 + 12x$  در بازه  $[-1, 3]$  کدام است؟

۲۸

۳۲

۶۳

۷۲

۱۳۴ - جدول تعیین علامت مشتق تابع مشتق پذیر به صورت رو به رو است. کدام گزینه درباره تابع  $y = f(x)$  درست است؟

$x$	-۴	-۱	۷
$y'$	+	+	-

۱) تابع  $f$  محور طول ها را در سه نقطه قطع می کند.

۲) تابع  $f$  روی بازه  $(-4, 7)$  غیریکنوا است.

۳) تابع  $f$ ، ۲ نقطه بحرانی دارد.

۴) تابع  $f$ ، ۲ اکسترمم نسبی دارد.

۱۳۵ - ضابطه تابع  $f$  به صورت  $\begin{cases} 4-x & x < 0 \\ 3+2x-x^2 & x \geq 0 \end{cases}$  است؟

۲) مینیمم نسبی است.

۴) مینیمم مطلق است.

۱) ماکریم نسبی است.

۳) بحرانی است، ولی اکسترمم نسبی نیست.

۱۳۶ - مجموع طول نقاط بحرانی تابع  $y = x(4-x)^3$  کدام است؟

۴

۵

۲

$\frac{13}{3}$

۱۳۷ - مقدار مینیمم نسبی تابع  $y = x - 4\sqrt{x}$  کدام است؟

۴

-۳

-۴

۱) صفر

۱۳۸ - بهای کدام مقدار  $a$ ، آهنگ لحظه‌ای تغییر تابع  $f(x) = \frac{ax-a}{x}$  در  $x=10$  برابر ۲ است؟

۴۰۰

۳۰۰

۲۰۰

۱۰۰

۱۳۹ - در جدول رو به رو، مقادیر تابع  $f$  و مشتق‌های آن در نقطه‌ای به طول ۳ آمده است. اگر تابع  $g$  با ضابطه  $(x) = f^3(x)$  تعریف شود، حاصل کدام است؟

۳۰

-۲۷

-۲۴

-۳۹

$x$  |  $f(x)$  |  $f'(x)$  |  $f''(x)$

۳	-۱	۲	-۵
---	----	---	----

۱۴۰ - مجموع ماکریم مطلق و مینیمم مطلق تابع  $y = \sqrt{4x-x^2} + 21$  در بازه  $[-1, 6]$  کدام است؟

۷

۸

۹

۱۰

۱۴۱ - حجم یک مکعب به وسیله تابع  $V(x) = x(10-2x)(16-2x)$  وقتی  $x < 5 < 10$ ، مدل سازی می شود. بیشترین مقدار حجم مکعب کدام است؟

۱۲۰

۱۴۴

۱۱۲

۱۰۰

۱۴۲ - فاصله نقاط اکسترمم نسبی تابع  $y = \frac{x^2-3}{x-2}$  از یکدیگر کدام است؟

۵

$2\sqrt{5}$

$2\sqrt{2}$

$\sqrt{13}$

۱۴۳ - اگر  $f'(4) \times g'(2) = \sqrt[3]{x^4 + 2x^3 + 3 + 1}$  و  $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 3x - 3}$  کدام است؟

۴

۲۴

۱۲

۸

۱۴۴ - تابع  $y = \sqrt[3]{x^2}(x+2)$  روی بازه  $(a, b)$  اکیداً نزولی است. حداقل مقدار  $b-a$  کدام است؟

۴

۰/۶

۰/۸

۱)

۱۴۵ - خطی که از نقطه  $(1, 2)$  می گذرد با محورهای مختصات در ربع اول تشکیل مثلثی به مساحت  $S$  می دهد. کمترین مقدار  $S$  کدام است؟

۴

۴/۵

۲

۵

۱۴۶- کدام عبارت در رابطه با همه انواع تولیدمثلهای گیاهی که به کمک بخش‌های رویشی صورت می‌گیرد، درست است؟

(۱) در آن از اندامی استفاده می‌شود که دارای یاخته‌های سرلادی و یاخته‌هایی با قدرت فتوسنتز است.

(۲) مواد مغذی و معدنی موردنیاز برای رشد گیاه جدید باید مستقیماً از گیاه دیگر و یا از خاک تأمین شود.

(۳) گیاه بدون نیاز به تولید گامت ایجاد می‌شود و به طورحتم دارای یاخته‌هایی با ژنوتیپ مشابه با مادر خواهد بود.

(۴) بخشی که منجر به ایجاد گیاه جدید می‌شود، دارای گره‌هایی است که یاخته‌های تمایزینیافته در آن تقسیم می‌شوند.

۱۴۷- با توجه به ویژگی‌های تولیدمثلهای رویشی، خوابانیدن برخلاف قلمه زدن چه مشخصه‌ای دارد؟

(۱) در آن از ساقه‌ای استفاده می‌شود که حاوی یاخته‌های بنیادی و تمایزینیافته است.

(۲) گیاه مادر به کمک یاخته‌های فتوسنتز کننده در تأمین مواد آلتی گیاه درحال رشد نقش دارد.

(۳) از قدرت تمایز یاخته‌هایی استفاده می‌شود که در اندامی تخصصی نیافته برای تولیدمثلهای قرار دارند.

(۴) بخشی از گیاه داخل خاک قرار می‌گیرد که در ابتدا می‌تواند بعضی از انواع اندام‌های رویشی را نداشته باشد.

۱۴۸- در مورد گیاهان کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

(۱) در طی رشد دونمو هر گیاه آونددار، پوسته دانه از تمایز پوسته تخمک ایجاد می‌شود.

(۲) در هر گیاه دانه‌دار در پی تبدیل سرلاد رویشی به زایشی، کلاله ایجاد می‌شود.

(۳) در هر گیاه گل‌دار، برگ‌های رویانی در ذخیره مواد غذایی نقش دارند.

(۴) در هر گیاه دولپه از تقسیم مریستم نوک ساقه، سه نوع سامانه بافتی ایجاد می‌شود.

۱۴۹- در گیاهان هر هورمونی که .....

(۱) موجب تحریک رشد طولی یاخته‌ها می‌شود، در تولید میوه‌های بدون دانه نقش دارد.

(۲) موجب افزایش طول ساقه می‌شود، در بیان ژن آمیلاز طی جوانه‌زنی نقش دارد.

(۳) موجب تولید میوه‌های بدون دانه می‌شود، در پیدیده چیرگی رأسی دارای نقش است.

(۴) موجب تحریک تقسیم یاخته‌ای می‌شود، پیر شدن اندام‌های هوایی را به تأخیر می‌اندازد.

۱۵۰- در پی پاسخ به تماس در گیاه .....

(۱) حساس، تا شدن برگ در پی تغییر فشار تورژسانس یاخته‌های قاعدة برگ انجام می‌گیرد.

(۲) مو، رشد یاخته‌ها در محل تماس افزایش می‌یابد.

(۳) توبرهواش، آزمیزهای ترشح شده از گل، حشره به دام افتداده را هضم می‌کنند.

(۴) گوشتخوار، تحریک یاخته‌های تمایزیافته سامانه زمینه‌ای منجر به ایجاد پیام‌هایی می‌شود.

۱۵۱- در گل ..... گیاه کدو، هر حلقه‌ای که قادر به ایجاد نوترکیبی به‌واسطه کراسینگ اور باشد، .....

(۱) نر- به تولید یاخته‌هایی با قدرت شرکت در لقاح می‌پردازد.

(۲) ماده- با رشد دادن بخش مشخصی از خود، میوه حقیقی تولید می‌کند.

(۳) نر- به تولید مواد آلتی از مواد معدنی می‌پردازد.

(۴) ماده- به‌منظور انجام خودلذاخی، اجازه رشد گرده رسیده بر روی خود را خواهد داد.

۱۵۲- کدام موارد جمله زیر را به درستی کامل می‌کند؟

«همه هسته‌های موجود در لوله گرده گیاه لوپیا، .....»

الف) حاصل تقسیم میتوز هستند.

ب) در لقاح شرکت می‌کنند.

ج) اطلاعات ژنتیکی یکسانی دارند.

د) درون لوله گرده تشکیل شده‌اند.

۱) الف- ب

۲) الف- ج

۳) ب- د

۴) ج- د

۱۵۳- چند مورد در رابطه با گیاه رویه رو به درستی بیان شده است؟

الف) به کمک تورژسانس، استحکام بخش‌هایی از پیکر خود را تأمین می‌کند.

ب) ساختار تخصصی‌بافتی برای تولیدمثلهای رویشی آن، موجب عمر طولانی تر می‌شود.

ج) در همه ساقه‌های خود دارای جوانه جانبه و رأسی و یاخته‌های نگهبان روزنے است.

د) اولین تقسیم میتوز یاخته تخم، منجر به تولید دو یاخته همان‌دازه می‌شود.

۱) ۲

۲) ۴

۳) ۳



۱۵۴- اینترفرون ساخته شده با .....

- (۱) مهندسی ژنتیک، ساختار نهایی یکسانی با اینترفرون طبیعی دارد.
- (۲) مهندسی پروتئین، ساختار اولیه یکسانی با اینترفرون طبیعی دارد.
- (۳) مهندسی ژنتیک، تعداد پیوند پپتیدی یکسانی با اینترفرون مهندسی پروتئین و طبیعی دارد.
- (۴) مهندسی پروتئین، فعالیت و پایداری یکسانی با اینترفرون طبیعی دارد.

۱۵۵- کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«درون هر ..... گیاهان نهان دانه، .....».

(۱) تخمک لقاح یافته - دو یاخته تخم دیپلولوئید و تریپلولوئید حاصل از لقاح، دیده می شود.

(۲) دانه بالغ - برخی از یاخته های رویان در تأمین مواد غذایی سایر یاخته ها دخالت دارند.

(۳) کیسه گرده - طی تقسیم پی در پی یاخته ها پلولوئید، ساختار مولد گامت ایجاد می شود.

(۴) ساختار اختصاصی برای تولید مثل جنسی - رنگ های درخشان به گردافشانی کمک می کند.

۱۵۶- از آمیزش دو گل مغربی نر و ماده با یکدیگر، ممکن است یاخته های آندوسپرم در هر هسته خود دارای ..... مجموعه فام تنی باشند. همچنین اگر ژنتیک پرچم گل مغربی  $AabbDd$  و ژنتیک گل مغربی  $aabbDd$  باشد، ژنتیک لوله گرده و لپه نمی تواند ..... باشد.

(۱)  $AabbDd$  و  $abd$       (۲) چهار -  $AaBBDd$  و  $ABD$       (۳) پنج -  $aabbDD$  و  $AbD$       (۴) شش -  $AabbDd$  و  $abd$

۱۵۷- صفت رنگ در نوعی ذرت دارای سه جایگاه زنی است که دگره های هر جایگاه با هم رابطه بارز و نهفتگی دارند. دگره های بارز در این صفت موجب تیره تر شدن رنگ می شوند، به طوری که هر ذرتی که دارای دگره های بارز بیشتری باشد، رنگ تیره تری خواهد داشت. به فرض اینکه در آندوسپرم نوعی از این گیاه ذرت ..... وجود داشته باشد، رنگ گیاه حاصل از رشد رویان ممکن نیست مشابه ذرتی با ژن نمود ..... باشد.

(۱) یک دگره بارز -  $AaBbCC$       (۲) یک دگره نهفته -  $aabbCc$       (۳) دو دگره بارز -  $AaBBCc$       (۴) دو دگره نهفته -  $aabbCC$

۱۵۸- چند مورد از موارد زیر در رابطه با همه گیاهان نهان دانه با گل های دوجنسی به درستی بیان شده است؟

(الف) داخلی ترین حلقه گل، مادگی نام دارد که از یک کلاله، خامه و تخدمان تشکیل شده است.

(ب) یاخته جنسی نر برخلاف یاخته جنسی نر جانوران، فاقد وسیله حرکتی و نیازمند لوله گرده است.

(ج) پوسته دانه همواره سخت است و رویان را از شرایط نامساعد محیطی و صدمات فیزیکی و شیمیابی حفظ می نماید.

(د) مواد حاصل از فتوستنتز در ریشه ذخیره شده و در سال بعدی برای تشكیل ساقه گل دار و دانه به مصرف می رستند.

(۱) ۱      (۲) ۲      (۳) ۳      (۴) ۴

۱۵۹- هر باکتری تثبیت کننده ..... ماده معدنی موجود در اتمسفر، .....

(۱) یک نوع - دارای رنگیزه فتوستنتز است.

(۲) یک نوع - دارای توانایی هم زیستی با ریشه گیاهان خاصی است.

(۳) دو نوع - از اکسایش مواد معدنی انرژی و الکترون کسب می کند.

(۴) دو نوع - همانند گیاهان فتوستنتز کننده، دارای کلروفیل  $a$  است.

۱۶۰- با توجه به گیاهان مطرح شده در کتاب درسی و ویژگی های آن ها، در کدام گزینه هر دو توضیح آورده شده، نمی تواند ویژگی یک گیاه یکسان باشد؟

(۱) به کمک هم زیستی با نوعی باکتری در ریشه، نیتروژن خود را به دست می آورد - زمانی گل می دهد که طول شب از حد معینی بیشتر نباشد.

(۲) به کمک اندام مکننده خود از مواد آلی گیاه دیگری استفاده می کند - در بخش قرار گرفته روی تکیه گاه و سمت مقابل آن تفاوت رشد دارد.

(۳) سبز است و در تالاب های شمال کشور زندگی می کند - در برخی برگ خود کرک هایی دارد که واکنش های بسته شدن آن را به راه می اندازد.

(۴) می تواند آرسنیک را در خود نگهداری کند - به منظور انجام تولید مثل جنسی، لقاح مضاعف انجام داده و در دانه خود دو نوع تخم دارد.

۱۶۱- کدام مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«جانوری که از گیاه آکاسیا محافظت می کند ..... جانوری که از گیاه تنباق کو محافظت می کند، .....»

(۱) مانند - به دنبال متصاعد شدن ترکیباتی از گیاه، به سمت آن کشیده می شود.

(۲) برخلاف - مستقیماً به حشرات تغذیه کننده از گیاه حمله کرده و آن را از بین می برد.

(۳) مانند - در شرایطی حتی به پستانداران کوچک و گیاهان دارزی روی گیاه هم حمله می کند.

(۴) برخلاف - در انتقال گرده های رسیده موجود در بخش نر گیاه به بخش ماده آن دخالت دارد.

# نیستشناختی

## دانشجویی آزمون سراسری ۱۴۰۰

- ۱۶۲- کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟  
 «با توجه به شرایط رشد دانه گیاهان اگر بذر مناسب گندم تحت تأثیر سرما قرار .....، هورمونی در دانه افزایش می‌یابد که .....»
- بگیرد- رشد ساقه را از طریق تحریک رشد طولی یاخته‌ها و تقسیم آن‌ها تحریک می‌کند.
  - نگیرد- در حفظ کردن آب موجود در گیاه در شرایط نامساعد محیطی و کم‌آبی دخالت دارد.
  - بگیرد- در فن کشت بافت موجب تحریک تبدیل یاخته‌های تمایزنيافته به یاخته‌های ساقه می‌شود.
  - نگیرد- موجب خروج یون‌های کلر و پتاسیم و مولکول‌های ساکارز از یاخته‌های نگهبان روزنه می‌شود.
- ۱۶۳- در گیاه گل رز در پی عمل آنزیم روپیسکو قطعاً .....  
 ۱) مولکول دوفسفاته ناپایداری ایجاد می‌شود.  
 ۲) ترکیبی دوکربنیه ایجاد می‌شود که منجر به تولید  $\text{CO}_2$  در راکیزه می‌شود.  
 ۳) در پی تجزیه یک ماده آلی، ATP تولید می‌شود.  
 ۴) محصولی ایجاد می‌شود که از چرخه کالوبن خارج شده و برای ساخت سایر مواد موردنیاز استفاده می‌شود.
- ۱۶۴- در نوعی تخمیر .....  
 ۱) که منجر به ورآمدن خمیر می‌شود، تبدیل اتانول به اتانول با تولید  $\text{CO}_2$  همراه است.  
 ۲) که در ماهیچه توانم رخ می‌دهد، تولید  $\text{H}^+$  در پی مصرف ATP رخ می‌دهد.  
 ۳) که عامل ترش شدن شیر است، اکسایش پیررووات در ماده زمینه سیتوپلاسم انجام می‌گیرد.  
 ۴) که در گیاهان رخ می‌دهد،  $\text{FADH}_2$  منجر به کاهش پیررووات می‌شود.
- ۱۶۵- چند جمله در مورد یاخته‌های کبدی در یک فرد بالغ و سالم درست است؟  
 (الف) برخی از یاخته‌های کبدی در محیط کشت به یاخته‌های مجرای صفوایی تمایز پیدا می‌کنند.  
 (ب) یاخته‌های کبدی برای بازسازی  $\text{NAD}^+$  مورد استفاده در گلیکولیز از زنجیره انتقال الکترون استفاده می‌کنند.  
 (ج) برخی از یاخته‌های کبدی با ترشح نوعی پیک شیمیایی در تنظیم تعداد گویچه‌های قرمز خون نقش دارند.  
 (د) برخی از یاخته‌های کبدی به یاخته‌های تولیدکننده لیپوپروتئین تمایز پیدا می‌کنند.
- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
|---|---|---|---|
- ۱۶۶- در طی فتوسنتز گیاهی که .....  
 ۱) برای ثبت  $\text{CO}_2$  تقسیم مکانی انجام داده است، قند سه‌کربنی را در یاخته میانبرگ می‌سازد.  
 ۲) طی روز اسید سه‌کربنی ایجاد می‌کند، همواره سازگاری جهت کاهش تنفس نوری دیده می‌شود.  
 ۳) یاخته غلاف آوندی ترکیب شش کربنی ایجاد می‌کند، قطعاً جدایی مکانی ثبت  $\text{CO}_2$  مشاهده می‌شود.  
 ۴) در آن pH یاخته فتوسنتز کننده در طول شب کاهش می‌یابد، در کریچه‌های خود پلی‌ساقارید دارد.
- ۱۶۷- چند گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می‌کند؟  
 «در یاخته‌های نگهبان روزنه در یک گیاه دولپه‌ای ..... برخلاف .....»  
 (الف)  $\text{NADPH-ATP}$ ، در بخش درونی میتوکندری ساخته می‌شود.  
 (ب)  $\text{O}_2 - \text{CO}_2$ ، فعالیت اکسیژنازی روپیسکو را افزایش می‌دهد.  
 (ج) ورود پتاسیم و کلر- خروج آن‌ها، از انجام واکنش‌های تنفس نوری ممانعت می‌کند.  
 (د)  $\text{NAD}^+ - \text{NADP}^+$ ، در بستر کلروپلاست بازسازی می‌شود.
- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
|---|---|---|---|
- ۱۶۸- در تصفیه فاضلاب‌ها برای حذف گازی بی‌رنگ و بدبو از جاندارانی تک‌یاخته‌ای استفاده می‌کنند. کدام ویژگی در مورد این جانداران نادرست است؟  
 ۱) دارای رنگیزه‌های جذب‌کننده نور هستند و گوگرد تولید می‌کنند.  
 ۲) طی واکنشی اکسایشی، آمونیوم را به نیترات تبدیل می‌کنند.  
 ۳) همانند برخی از بیوکاریوت‌های تک‌یاخته‌ای قادر به تولید اکسیژن نیستند.  
 ۴) برای ثبت کربن دی‌اکسید از هیدروژن سولفید به عنوان منبع الکترون استفاده می‌کنند.
- ۱۶۹- عصاره برگ گیاهی در دو زمان یکی در آغاز تاریکی (شب) و دیگری در آغاز روز (صبح روز بعد) استخراج و pH آن اندازه‌گیری شد. عصاره این گیاه در آغاز روز نسبت به آغاز تاریکی اسیدی‌تر بود. ویژگی این گیاه در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  
 ۱) برگ، ساقه یا هر دوی آن‌ها در این گیاه گوشتشی و پرآب است.  
 ۲) ثبت کربن در این گیاه طی دو مرحله و در دو نوع یاخته متفاوت انجام می‌شود.  
 ۳) طی روزهای گرم و در برابر نور شدید، واکنش‌های تنفس نوری را به شدت انجام می‌دهد.  
 ۴) درون پلاست‌های خود ترکیباتی دارد که آب را نگه می‌دارند.



# نیستشناس

## داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰

۱۷۸- چند مورد جمله زیر را به درستی کامل می کند؟

«ترکیبی که پس از ورود به لوله گوارش حشره فعال شده و سبب مرگ حشره می شود، قطعاً.....»

(الف) تنفس یاخته‌ای حشره را متوقف کرده است.

(ب) در جانداری ساخته شده است که فامتن‌ها در مرحله S مضاعف می‌شوند.

(ج) در جاندار سازنده، اندازه بزرگتری داشته است.

(۱) صفر

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

۱۷۹- دانشمندان بر اساس وضعیت زمین در آغاز شکل گیری حیات بر این باورند که گروهی از باکتری‌ها از قدیمی‌ترین جانداران روی زمین هستند.

چند جمله در مورد این باکتری‌ها درست است؟

(الف) مانند سیانوبکتری‌ها، سبزیجات ۲ دارند.

(ب) بخش عده فتوسنتر را انجام می‌دهند.

(ج) نقش مهمی در چرخه نیتروژن دارند.

(د) حاوی آنزیمهایی هستند که در واکنش‌های اکسایش و کاهش شرکت می‌کنند.

(۱) ۱


۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱۸۰- منحنی زیر، میزان فتوسنتر در دو نوع گیاه ۱ و ۲ را نشان می‌دهد. کدام گزینه مقایسه بین این دو گیاه را به درستی بیان می‌کند؟

میزان فتوسنتر



(۱) روزنه‌هایی هر دو گیاه به منظور فتوسنتر، شب‌هنگام بسته می‌باشد.

(۲) معمولاً ضخامت لایه کوتیکول برگ در گیاه ۱ از ۲ بیشتر است.

(۳) احتمال حضور یاخته‌های معبر در ریشه گیاه ۲ از ۱ بیشتر است.

(۴) افزایش دمای محیط در هر دو باعث ترشح هورمون آبسیزیک اسید می‌شود.

۱۸۱- چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟

«هر جانداری که .....، به طور حتم .....»

(الف) کربن دی اکسید را ثابت می‌کند - ATP را در سطح پیش‌ماده تولید می‌کند.

(ب) نیتروژن را ثابت می‌کند - در فرایند فتوسنتر اکسیژن را نیز تولید می‌کند.

(ج) در واکنش‌هایی وابسته به نور ATP می‌سازد - در دمای بالا تمام روزنه‌های خود را می‌بندد.

(د) روزنه‌های هوایی خود را شب‌هنگام باز می‌کند - در تاریکی از ماده معدنی، ماده آلی را می‌سازد.

(۱) ۱

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱۸۲- نوعی جاندار تک یاخته‌ای که در حضور نور فتوسنتر می‌کند و در غیاب نور کلروپلاست‌های خود را از دست می‌دهد. کدام ویژگی را ندارد؟

(۱) برای گروهی از ژن‌های این جاندار بیش از یک توالی تنظیمی وجود دارد.

(۲) چندین جایگاه آغاز همانندسازی در هر فامتن هسته‌ای آن وجود دارد.

(۳) با از دست دادن سبزدیسه‌های خود، قادر دنای حلقوی می‌شود.

(۴) منبع تأمین الکترون در آن مانند گیاهان، مولکول‌های آب است.

۱۸۳- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟

«در ویروس HIV که عامل بیماری ایدز است، نوعی نوکلئیک اسید یافت می‌شود که .....»

(۱) قطعاً در آن نسبت بازهای پورین به پیریمیدین برابر یک است. (۲) هرگز باز آلی تیمین در آن به کار نرفته است.

(۳) با فناوری‌های مبتنی بر زیست‌فناوری قابل تشخیص نیست. (۴) الگوی ساخت نوعی نوکلئیک اسید تکرشته‌ای است.

۱۸۴- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟

«برای تهییه واکسن به روش مهندسی ژنتیک لازم است که .....»

(۱) در ابتدا سموم میکروب‌ها غیرفعال شده و پس از آن تزریق سموم انجام شود.

(۲) عامل غیربیماری‌زا حاوی ژن ایجاد‌کننده بیماری به بدن آدمی تزریق شود.

(۳) ژن نوعی آنتی‌ژن بیماری‌زا به ویروس یا باکتری غیربیماری‌زا منتقل شود.

(۴) عامل غیربیماری‌زا حاوی ژن خارجی به باکتری بیماری‌زا وارد شود.

۱۸۵- کدام جمله در مورد فرایند فتوسنتر در گیاهان نادرست است؟


(۱) در فرایند فتوسنتر تمام اکسیژن‌های تولیدی از مولکول‌های آب تأمین می‌شود.

(۲) آن‌های کربن در مولکول‌های کربن دی اکسید با گرفتن الکترون کاهش می‌یابند.


(۳) سطح انرژی مولکول‌های پذیرنده الکترون در واکنش‌های نوری افزایش می‌یابد.

(۴) در واکنش‌های کالوین به ازای هر مولکول گلوکز، شش مولکول اکسیژن تولید می‌شود.


۱۸۶- اگر  $\vec{v}$  سرعت،  $\vec{B}$  میدان مغناطیسی و  $\vec{F}$  نیروی مغناطیسی را نشان دهد، در کدام شکل(ها) جهت نیروی وارد بر ذره باردار مثبت، درست نشان داده شده است؟



(۴) ج





(۳) ب-ج



(۲) الف-ج

(۱) الف-ب

۱۸۷- مطابق شکل، یک ذره باردار منفی با جرم ناچیز، با سرعت  $\vec{v}$  در امتداد محور  $x$  وارد فضایی می‌شود که میدان‌های یکنواخت  $\vec{E}$  و  $\vec{B}$  وجود دارد. اندازه این میدان‌ها برابر با  $E = 200 \frac{N}{C}$  و  $B = 5T$  است. تندي ذره مطابق با کدام گزینه باید باشد تا به سمت بالای صفحه منحرف شود؟







(۱) کمتر از  $100 \frac{m}{s}$

(۲) بیشتر از  $100 \frac{m}{s}$

(۳) کمتر از  $400 \frac{m}{s}$

(۴) بیشتر از  $400 \frac{m}{s}$

۱۸۸- خطوط میدان مغناطیسی یک آهنربای C شکل به همراه قطب‌های آن، در کدام گزینه درست نشان داده شده است؟



۱۸۹- یک ذره با بار  $20nC$  و جرم  $20 \times 10^{-11} g$  با تندي  $10 \frac{m}{s}$  در یک میدان مغناطیسی یکنواخت حرکت می‌کند. اگر زاویه بین سرعت حرکت ذره

با میدان مغناطیسی  $26^\circ$  و شتاب ذره  $4 \frac{m}{s^2}$  باشد، اندازه میدان مغناطیسی چند تسلای است؟ (اثر وزن ذره را نادیده بگیرید؛

$$(\sin 26^\circ = 0.44)$$

(۱) ۰/۵

(۲) ۰/۲۵

(۳) ۰/۲

(۴) ۰/۲


۱۹۰- در شکل رویه‌رو، دو سیم‌لوله P و Q هم‌محور، هم‌طول و دارای تعداد حلقه برابر هستند.

وقتی از سیم‌لوله‌ها جریان‌های  $I_1$  و  $I_2$  در جهت‌های نشان داده شده عبور می‌کنند، میدان مغناطیسی خالص در نقطه M برابر  $\vec{B} = (0.4T)$  است. اگر جریان  $I_2$  را قطع کنیم، بزرگی میدان در نقطه M برابر با  $1/10 T$  می‌شود. جریان  $I_1$  چند برابر جریان  $I_2$  است؟

(۱)  $\frac{1}{3}$

(۲)  $\frac{1}{5}$

(۳) ۵



۱۹۱- با قرار دادن مواد فرومغناطیسی نرم در میدان مغناطیسی خارجی قوی، خاصیت مغناطیسی در آن‌ها به صورت ..... و ..... ایجاد می‌شود.

(۱) قوی- دائمی (۲) قوی- موقتی (۳) ضعیف- دائمی (۴) ضعیف- موقتی

۱۹۲- سیمی که مقاومت هر متر آن  $2\Omega / m$  است را به صورت حلقه‌ای با شعاع  $2m$  درآورده و مانند شکل رویه‌رو


در یک میدان مغناطیسی بروون سو قرار داده‌ایم. اگر در مدت  $5s$  میدان مغناطیسی را از  $0 / 2T$  بروون سو به  $8T / 0$  درون سو تغییر دهیم، جریان القایی متوسط در حلقه چند آمپر خواهد بود؟ ( $\pi = 3$ )

(۱) ۵

(۲) ۶

(۳) ۱۰


(۴) ۱۲



# فیزیک

## داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰

۱۹۳- مطابق شکل، حلقه رسانایی بین دو سیم حامل جریان‌های  $I_1$  و  $I_2$  قرار دارد. برای آنکه هر دو سیم در ایجاد جریان القایی پاد ساعت‌گرد در حلقه مؤثر باشند، باید جریان  $I_1$  ..... و جریان  $I_2$  ..... باید.



- (۱) کاهش - کاهش
- (۲) افزایش - افزایش
- (۳) کاهش - افزایش
- (۴) افزایش - کاهش


۱۹۴- اگر جریان عبوری از یک القاگر آرمانی با ضربی القاوری  $H = \frac{I}{2\pi r}$  را از  $2A$  به  $8A$  برسانیم، ..... ژول انرژی در القاگر ..... می‌شود.

(۱)  $\frac{1}{4}$ ، تلف (۲)  $\frac{5}{4}$ ، ذخیره (۳)  $\frac{9}{4}$ ، تلف (۴)  $\frac{5}{4}$ ، ذخیره

۱۹۵- اگر معادله جریان - زمان یک مولد جریان متناوب برحسب یکاهای SI به صورت  $I = 5\sin 4\pi t$  باشد، در لحظه  $t = \frac{1}{80}$  s، جریان مدار و شار مغناطیسی عبوری از بیچه مولد به ترتیب کدام است؟

- (۱)  $5A$ ، بیشینه (۲) صفر، بیشینه (۳)  $5A$ ، صفر (۴) صفر، صفر

۱۹۶- شکل رو به رو مسیر پرتو نوری که از نقطه  $M$  به آینه ۱ و پس از بازتاب از روی آن به آینه ۲ می‌تابد را نشان می‌دهد. زاویه بین دو آینه (a) چند درجه است؟




۱۰۰ (۱)

۱۱۰ (۲)

۱۲۰ (۳)

۱۳۰ (۴)

۱۹۷- در شکل رو به رو، وقتی شخص ۲ کنار دیوار ایستاده است، صدای دست زدن شخص ۱ را پس از  $35/0$  می‌شنود. اگر شخص ۲ در نقطه  $M$  باشد، هم صدای مستقیم دست زدن شخص ۱ و هم پژواک آن از روی دیوار را می‌شنود. فاصله شخص ۱ از نقطه  $M$  حداقل چند متر می‌تواند باشد؟



$$\text{باشد؟ } 320 \frac{\text{m}}{\text{s}} = \text{صوت در هوای} v$$

۳۲ (۱)

۴۸ (۲)

۶۴ (۳)

۸۰ (۴)

۱۹۸- نوعی جانور با استفاده از پژواک امواج صوتی با بسامد  $108 \text{ kHz}$ ، جسمی با ابعاد حداقل  $1/2 \text{ cm}$  را می‌تواند تشخیص دهد. برای آنکه این جانور در همان محیط بخواهد جسمی با ابعاد  $9 \text{ cm} / 0$  را تشخیص دهد، باید بسامد موج فراصوتی را حداقل چند کیلوهرتز و چگونه تغییر دهد؟

- (۱)  $36$ ، افزایش (۲)  $27$ ، کاهش (۳)  $27$ ، کاهش (۴) افزایش

۱۹۹- در کدام وسیله، از سازوکار سطوح کاو (خمیده) برای بازتاب و کانونی نمودن امواج استفاده نمی‌شود؟

- (۱) رادر دوپلر (۲) اجاق خورشیدی (۳) دستگاه لیتوتریپسی (۴) میکروفون سهمومی

۲۰۰- کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) وقتی موج به مرز جدایی دو محیط می‌رسد، پخشی از آن بازتاب، پخشی عبور و پخشی جذب می‌شود.


- (۲) وقتی پرتو نوری به طور عمود از هوا بر سطح آب بتابد، بدون شکست و تغییر طول موج وارد آب می‌شود.

- (۳) وقتی یک موج سینوسی از یک محیط وارد محیط دیگری می‌شود، بسامد آن ثابت می‌ماند.

- (۴) وقتی یک موج سینوسی از قسمت ضخیم یک طناب به قسمت نازک آن وارد می‌شود، طول موج آن افزایش می‌یابد.



۲۰۱- مطابق شکل، پرتو نوری از محیط شفاف ۱ به محیط شفاف ۲ می‌تابد و تندي آن هنگام ورود به محیط ۲ به اندازه  $4 \times 10^{-7} \frac{\text{m}}{\text{s}}$  تغییر می‌کند. تندي نور در محیط ۲ چند متر بر ثانیه است؟  $(\sin 37^\circ = 0.6)$




$$1/2 \times 10^{-8} \quad (1)$$

$$2/4 \times 10^{-8} \quad (2)$$

$$2 \times 10^{-8} \quad (3)$$

۲۰۲- شکل زیر طرحی از بازتاب و شکست نور در عبور یک پرتوی نور از هوا به یک ماده شفاف را نشان می‌دهد. اگر زمان پیمودن مسیر AOC توسط نور به اندازه  $4 \text{ ns}$  با زمان پیمودن مسیر AOB اختلاف داشته باشد، ضریب شکست ماده شفاف کدام است؟

$$(c = 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}, AO = OC = OB = 1\text{m})$$



$$1/2 \quad (1)$$

$$1/23 \quad (2)$$

$$2/1 \quad (3)$$

$$2/2 \quad (4)$$

۲۰۳- در پاسندگی نور سفید در شیشه معمولی، هر اندازه طول موج نور تابیده شده بیشتر باشد، ضریب شکست شیشه برای آن نور ..... و زاویه شکست آن نور درون شیشه در مقایسه با سایر طول موج‌های نور سفید ..... است.

- (۱) بیشتر- بزرگ‌تر      (۲) بیشتر- کوچک‌تر      (۳) کمتر- بزرگ‌تر      (۴) کمتر- کوچک‌تر

۲۰۴- کدام گزینه با اثر فوتوالکترویک سازگار است؟

- (۱) با هر بسامدی از موج الکترومغناطیسی می‌توان از فلز الکترون جدا نمود.

(۲) چنانچه شدت هر نوری را به حد کافی افزایش دهیم، با تابیدن آن روی فلز می‌توان الکترون جدا نمود.

(۳) افزایش شدت نوری که از فلز الکترون جدا می‌کند، سبب افزایش انرژی جنبشی فوتوالکترون‌های آن می‌شود.

(۴) برای افزایش انرژی جنبشی فوتوالکترون‌های یک فلز، باید بسامد نور تابیده شده را زیاد کرد.

۲۰۵- چنانچه یک لامپ در مدت  $1/5 \text{ min}$   $2 \times 10^{21}$  فوتون با طول موج  $440 \text{ nm}$  را گسیل نماید، توان لامپ چند وات است؟

$$(h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}, c = 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}})$$

$$20 \quad (4)$$

$$10 \quad (3)$$

$$5 \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$

۲۰۶- بلندترین طول موج ناحیه مرئی در طیف گسیلی اتم هیدروژن، چند برابر کوتاه‌ترین طول موج ممکن در طیف این اتم است؟

نام طیف	نیمان	المر	پاشن	براکت	پفوند
مقدار $n'$	۱	۲	۳	۴	۵

$$5/4 \quad (2)$$

$$7/2 \quad (1)$$

$$1/8 \quad (4)$$

$$3/6 \quad (3)$$

۲۰۷- سومین خط در ناحیه مرئی طیف گسیلی اتم هیدروژن، به چه رنگی است؟

- (۱) بنفسی      (۲) قرمز      (۳) آبی      (۴) نیلی

۲۰۸- اجسام در دماهای بالا از سطح خود بیشتر تابش ..... دارند و در دماهای معمولی بیشتر تابش گسیل شده از سطح اجسام در ناحیه ..... است.

- (۱) فروسخ- مرئی      (۲) مرئی- فروسخ      (۳) فرابینفس- فروسخ      (۴) فروسخ- فرابینفس

۲۰۹- در مورد سومین خط رشته پاشن ( $n' = 2$ ) در طیف گسیلی اتم هیدروژن، مقدار  $n$  برابر با ..... بوده و این خط در گستره ..... طول موج‌های الکترومغناطیسی واقع است.

- (۱) فروسخ      (۲) فروسخ- مرئی      (۳) فرابینفس      (۴) فرابینفس

۲۱۰- یک لامپ با توان  $314 \text{ W}$  روشن است و نور آن به طور یکنواخت در فضای اطراف پخش می‌شود. اگر فقط  $40\%$  درصد از انرژی لامپ به صورت نور مرئی منتشر شود، شدت تابشی نور مرئی این لامپ در فاصله  $1 \text{ کیلومتری}$  آن چند وات بر متر مربع است؟

$$10^{-5} \quad (1)$$





$$10^{-6} \quad (2)$$

$$10^{-7} \quad (3)$$

$$10^{-8} \quad (4)$$



۲۱۹- کدام ترکیب‌ها می‌توانند به تنها یک مونومر سازنده یک پلی‌استر یا پلی‌آمید باشند؟



(۴) پ و ت

(۳) ب و پ

(۲) الف و ب

(۱) الف و پ

۲۲۰- ساختار زیر مربوط به نوعی پلی‌استر است. کدام توصیف درباره آن درست است؟ ( $H=1, C=12, O=16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ )

(۱) در ساختار الكل سازنده آن، ۱۳ پیوند کووالانسی وجود دارد.

(۲) اختلاف جرم مولی اسید و الكل سازنده آن  $4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$  است.

(۳) هر مول از الكل سازنده آن برای سوختن کامل به  $7/5$  مول گاز اکسیژن نیاز دارد.

(۴) فرمول شیمیایی آن به صورت  $\text{C}_{8}\text{H}_{12}\text{O}_4$  است.


۲۲۱- کدام گزینه درست است؟

(۱) پلیمرهای حاصل از هیدروکربن‌های سیرشده، تمایلی به انجام واکنش ندارند.

(۲) ویتامین کا (K) برخلاف ویتامین ث (C)، در آب نامحلول است.

(۳) نقطه جوش ساده‌ترین عضو خانواده استرها از نقطه جوش اتانوئیک اسید بیشتر است.

(۴) پلی‌لاکتیک اسید از جمله پلیمرهای سبز است و تنها پس از چند سال، به مولکول‌های ساده تبدیل می‌شود.



۲۲۲- استری به جرم مولی  $10.2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$  در اثر آبکافت، الكلی تولید می‌کند که می‌توان برای آن دو ساختار الكلی در نظر گرفت. اگر جرم اسید حاصل از واکنش آبکافت  $5/4$  مول از این استر، ۱۲ گرم باشد، بازده درصدی این فرایند کدام است؟ (زنجیره‌های هیدروکربنی در ساختار استر را سیرشده در نظر بگیرید و  $H=1, C=12, O=16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ )

(۹۰) (۴)

(۷۵) (۳)

(۶۰) (۲)

(۴۰) (۱)

۲۲۳- چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟

الف) فرمول شیمیایی سدیم اکسید نشان می‌دهد که در ساختار این ماده، هر یون اکسید به دو یون سدیم متصل است.

ب) عدد کوئوردیناسیون یک آنیون در ترکیب یونی، شمار نزدیک ترین آنیون‌های اطراف آن را در شبکه بلوری آن ترکیب نشان می‌دهد.

پ) در شبکه بلور ترکیب‌های مانند سدیم کلرید و کلسیم کلرید، عدد کوئوردیناسیون کاتیون و آنیون با هم برابر است.

ت) در ترکیب‌های یونی دوتایی، یون با شعاع بزرگ‌تر عدد کوئوردیناسیون بزرگ‌تری دارد.

(۳) (۴)

(۲) (۳)

(۱) (۲)

(۱) صفر

۲۲۴- در مقایسه کاتیون‌هایی که آرایش الکترونی یکسانی دارند، با افزایش عدد اتمی، ..... کاهش ..... افزایش می‌یابد.

(۱) اندازه بار - چگالی بار (۲) چگالی بار - شعاع یون (۳) چگالی بار - اندازه بار (۴) شعاع یون - اندازه بار

۲۲۵- اگر برای فروپاشی  $0.05$  مول از شبکه یونی لیتیم فلورورید،  $5/2 \text{ kJ}$  گرما نیاز باشد، آنتالپی فروپاشی شبکه یونی پتابسیم برمید و سدیم کلرید بر حسب  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$  به ترتیب از راست به چپ، کدام عدددها می‌توانند باشند؟

(۲۴۸۸، ۹۲۶) (۴)

(۷۸۷، ۶۸۹) (۳)

(۹۲۶، ۲۴۸۸) (۲)

(۶۸۹، ۷۸۷) (۱)

۲۲۶- کدام رنگ‌دانه زیر، همه امواج الکترومغناطیس در محدوده  $400 - 700 \text{ nm}$  را جذب می‌کند؟

(۱) تیتانیم دی‌اکسید (۲) آهن (III) اکسید (۳) دوده (۴) آلومینیم اکسید

۲۲۷- کدام آرایش الکترونی را می‌توان برای یون وانادیم (V<sub>۲۳</sub>) موجود در محلولی از آن به رنگ سبز، در نظر گرفت؟

[Ar] ۲d<sup>۱</sup> (۴)[Ar] ۳d<sup>۲</sup> (۳)[Ar] ۲d<sup>۳</sup> (۲)

[Ar] (۱)

۲۲۸- چه تعداد از مقایسه‌های زیر در ارتباط با تیتانیم و فولاد درست است؟

الف) حجم ۱ گرم تیتانیم بیشتر از حجم ۱ گرم فولاد است.

ب) در آب دریا، تیتانیم ماندگاری بیشتری در مقایسه با فولاد دارد.

پ) در شرایط مناسب برای خوردگی، تیتانیم آسان‌تر از فولاد دچار خوردگی می‌شود.

ت) به دلیل مقاومت بسیار بیشتر تیتانیم در برابر سایش نسبت به فولاد، برای ساخت پروانه کشتی‌ها از تیتانیم استفاده می‌شود.

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

## ششم

### دانلود آزمون سراسری ۱۵۰۰

۱۵

- ۲۲۹- کدام عبارت‌ها درست هستند؟

الف) تنوع و شمار مواد مولکولی بیشتر از مواد یونی و مواد کووالانسی است.

ب) سیلیس یک ساینده ارزان است که در تهیه سنباده به کار می‌رود.

پ) در آلیاژ هوشمند نیتینول، از فلزهای نیکل و تالیم استفاده می‌شود.

ت) هر الکترون موجود در دریای الکترونی فلزها متعلق به کل شبکه بلوری است.

۴) پ و ت

۳) الف و ت

۲) ب و پ

۱) الف و پ

- ۲۳۰- کدام عبارت درست است؟

۱) در هوای آلووده، با کاهش مقدار اوزون، مقدار نیتروژن دی‌اکسید افزایش می‌یابد.


۲) اغلب آلاینده‌های هوای گازهای بی‌رنگی هستند که برای تشخیص آن‌ها از برهم‌کنش مواد با امواج الکترومغناطیس می‌توان بهره برد.

۳) برای شروع هر واکنش شیمیایی به مقدار معینی انرژی نیاز است که آنتالپی واکنش نامیده می‌شود.



۴) هرچه تفاوت محتوای انرژی واکنش دهنده‌ها و فراورده‌ها بیشتر باشد، انرژی لازم برای شروع واکنش بیشتر است.

- ۲۳۱- اگر نمودار روبه‌رو مربوط به یک واکنش در غیاب کاتالیزگر باشد، کدام نمودار را می‌توان به همان واکنش در حفسور کاتالیزگر نسبت داد؟



(مقیاس نمودارها یکسان است).



- ۲۳۲- کدام واکنش در مبدل کاتالیستی خودروهای بنزینی انجام نمی‌شود؟



- ۲۳۳- با توجه به نمودارهای داده شده، کدام عبارت‌های زیر درست هستند؟



الف) هر دو واکنش در شرایط معمولی انجام نشده و یا به کندی انجام می‌شوند.

ب) فرایند تولید NO از گازهای نیتروژن و اکسیژن، گرماده است.

پ) در شرایط یکسان، سرعت مصرف شدن گاز NO کمتر از سرعت تولید شدن گاز CO2 است.

ت) از گرمای حاصل از تولید یک مول کربن دی‌اکسید، می‌توان برای آغاز واکنش  $\text{2NO(g)} \rightarrow \text{N}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)}$  استفاده کرد.

۴) ب و ت

۳) پ و ت

۲) الف و پ





۱) الف و ب

# داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰

## شیمی

۱۶

-۲۳۴- با توجه به نمودار زیر که مربوط به تغییر مول مواد موجود در ظرف، از لحظه آغاز واکنش تا برقراری تعادل است، کدام معادله شیمیایی را می‌توان به تعادل برقرارشده در سامانه نسبت داد؟



-۲۳۵- ۰/۰ مول گاز نیتروژن مونوکسید در ظرف ۱۰ لیتری وارد می‌شود تا در شرایط مناسب تجزیه شده و با گازهای اکسیژن و نیتروژن به تعادل برسد. اگر در لحظه تعادل، غلظت نیتروژن مونوکسید ۰/۰۰۸ مول بر لیتر باشد، مقدار ثابت تعادل برقرارشده در ظرف کدام است؟

$$(1) ۰/۱۸ \quad (2) ۴/۵ \times 10^{-3} \quad (3) ۰/۵۶۲۵ \quad (4) ۴/۵ \times 10^{-۶}$$

-۲۳۶- در ظرفی با حجم معین، ۰/۰۷ مول  $H_2$ ، ۰/۰۷ مول  $N_2$  و ۰/۱۴ مول  $NH_3$  در تعادل  $2NH_3(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons 2N_2(g) + 2H_2(g)$  هستند. اگر بدون تغییر دما، ۰/۰۵ مول گاز نیتروژن به این سامانه وارد شود، .....

(۱) سامانه از تعادل خارج می‌شود و تعادلی جدید برقرار می‌شود که دارای ۰/۷۶ مول گاز است.

(۲) با تغییر اعمال شده، سرعت واکنش رفت افزایش می‌باید و تعادلی با ثابت تعادل بزرگ‌تر در سامانه برقرار می‌شود.

(۳) در تعادل جدید، شمار مول‌های گاز هیدروژن برخلاف دو ماده دیگر، کمتر از تعادل اولیه است.

(۴) سامانه از تعادل خارج شده و با رساندن مقدار آمونیاک به ۰/۴ مول، دوباره تعادل برقرار می‌شود.

-۲۳۷- تعادل گازی  $yC + xB \rightleftharpoons 2A + yB$  در ظرفی به حجم ۵ لیتر برقرار است. با افزایش حجم ظرف به ۱۰ لیتر و برقراری تعادلی جدید، شمار مول گاز C نسبت به تعادل اولیه بیشتر شده است. بر این اساس، .....

(۱)  $x$  حداقل برابر با  $y$  است.  $y$  حداقل ۲ واحد از  $x$  کوچکتر است.

(۲) برای  $y$  حداقل  $2/4$  برابر  $x$  برخلاف  $y$ ، می‌توان عدد ۱ را در نظر گرفت.

-۲۳۸- مقدار ثابت تعادل واکنش:  $2A(g) \rightleftharpoons B(g) + 2C(g)$  در دمای ۲۵ و ۲۰۰ درجه سلسیوس به ترتیب برابر با  $10^{-6} \times 10^{-4}$  و  $10^{-1}$  است. بر این اساس، .....

(۱) با افزایش دمای مخلوط تعادلی، شمار مول‌های گاز A موجود در تعادل بیشتر می‌شود.

(۲) واکنش موردنظر از دسته واکنش‌های تعادلی گرماده محسوب می‌شود.

(۳) افزایش دما و کاهش حجم ظرف، باعث افزایش شمار مول‌های گاز C می‌شوند.

(۴) کاهش دما و افزایش فشار مخلوط، شمار مول‌های گاز B موجود در ظرف را کاهش می‌دهند.

-۲۳۹- کدام عبارت نادرست است؟


(۱) وقتی حجم یک سامانه تعادلی گازی را کاهش می‌دهیم، غلظت همه گونه‌های موجود در تعادل افزایش می‌باید.

(۲) با تغییر حجم ظرف سامانه تعادلی  $2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ ، گرچه شمار مول‌های مواد موجود در سامانه تغییر می‌کند، ولی ثابت تعادل تغییری نمی‌کند.

(۳) در فرایند هابر، در دمای ثابت، با افزایش فشار درصد مولی آمونیاک در سامانه افزایش می‌باید.

(۴) با افزایش فشار در سامانه‌ای که گازهای  $N_2O_4$  و  $NO_2$  در تعادل هستند، شمار مول‌های گاز  $N_2O_4$  افزایش می‌باید.

-۲۴۰- مقدار ثابت تعادل واکنش:  $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$  با کاهش دما، کاهش می‌باید. با اعمال تغییری در این سامانه تعادل (۱)، شمار مول‌های گاز اکسیژن موجود در ظرف به صورت رو به رو تا برقراری تعادل جدید (تعادل ۲) تغییر می‌کند. کدام تغییر زیر می‌تواند در سامانه اعمال شده باشد؟



(۱) افزایش دمای سامانه یا افزایش حجم ظرف

(۲) خارج کردن مقداری گاز اکسیژن از ظرف

(۳) کاهش حجم ظرف یا خارج کردن مقداری  $SO_3$  از ظرف

(۴) خارج کردن مقداری  $SO_2$  از ظرف یا کاهش دمای سامانه